

■ Especial

Alergia a la picadura de **AVISPAS** DEL GÉNERO **VÉSPULA**



Comité de Alergia a Himenópteros

Redactado por:
Miguel Ángel Baltasar Drago

En todas las especies de véspidos sociales, sólo las hembras fecundadas (reinas) sobreviven al invierno.

Las avispas defienden con enorme agresividad tanto la comida que han recolectado como el avispero. Generalmente *Vespula* es un género muy agresivo y suele picar en repetidas ocasiones a la menor provocación.


El aguijón se sitúa en el extremo posterior del cuerpo de las hembras y lleva unas glándulas anejas que producen veneno (mezcla compleja de proteínas).

La picadura de las avispas resulta más o menos molesta, según la zona y la sensibilidad de la víctima. En casos de sensibilidad máxima pueden producirse choques anafilácticos, que de no tratarse rápidamente pueden llegar a ser mortales.

A diferencia de lo que ocurre con la picadura de las abejas y abejorros (Apoideos), tras la cual el aguijón queda sujeto a la piel, las avispas son capaces de retraerlo con facilidad y no lo pierden.

El género *Vespula* forma parte de la Familia Vespidae o véspidos (avispa), comprenden muchas especies que provocan con frecuencia reacciones alérgicas al veneno que inoculan al picar.

Las especies más conocidas, ya sea por su abundancia o por ciertas particularidades de su ciclo biológico, son *Vespula vulgaris* (avispa común), *Vespula germanica* y *Vespula austriaca* (avispa cuco).

Bable:	Aviéspara	
Castellano:	Avispa, avispa común, avispa alemana, avispa cuco.	
Català:	Vespa, vespa comuna	
Euskera:	Liztor, liztor arrunta, liztorrak, urubio.	
Galego:	Avespa, vespa, véspora, nespra.	
Inglés:	Wasp, Yellow jackets.	

Descripción: individuos de 12-17,5 milímetros de longitud; cabeza, tórax y abdomen negro y amarillo (o blanco). Al contrario de las abejas presentan una separación clara entre torax y abdomen. Sin sedas (cuerpo liso).

Hábitat: prados, jardines, setos, bosques con nidos generalmente en la tierra o a nivel del suelo (focones caídos), en ambientes urbanos debajo de las escaleras, en postes, cercas, paredes, cajas desechadas, etc.

Además de picar, las avispas muerden con cierta fuerza con sus potentes mandíbulas. Esta mordedura no suele tener consecuencias.

¿Qué es el veneno?:

Compuesto proteico con diversas actividades (toxicidades), algunas son enzimas.

¿Cómo se produce la alergia?:

Las personas alérgicas desarrollan anticuerpos (defensas) de la clase IgE contra el veneno. En posteriores picaduras (nuevas exposiciones al veneno) la respuesta alérgica produce síntomas, de gravedad variable.

¿Cuándo y como se producen?:

La mayoría de picaduras se producen durante los meses de verano (mayor población de abejas y mayor exposición de las personas), aunque no es inhabitual observar picaduras antes de esta estación. Los apicultores y sus familiares están expuestos casi todo el año.

■ Especial

Alergia a la picadura de **AVISPAS** DEL GÉNERO **VÉSPULA**

¿Qué síntomas produce?:

Las reacciones alérgicas a picaduras suelen ser de tres tipos:

- **Reacciones localizadas alrededor de la picadura:** con inflamación de la zona (más de 10 cm de diámetro) y dolor, generalmente persistentes más de 24 horas. No suele indicarse la inmunoterapia. La mayoría de reacciones locales requieren exclusivamente la limpieza de la herida (con agua y jabón) y la aplicación de frío local (disminuye el edema y actúa como analgésico). En los casos más graves pueden indicarse antihistamínicos y/o corticoides.
- **Reacciones generales** (prevalencia 2.3% en población rural): urticaria, edema, ahogo,

bajadas de tensión arterial, inestabilidad, hasta llegar a la reacción anafiláctica y el choque, que son los cuadros clínicos más graves (1-5 muertes/10 millones de personas/año

- **Reacciones retardadas:** más raras y en las que no se indica la inmunoterapia.



Recomendaciones

para el paciente con alergia al veneno de himenópteros.

En la mayoría de ocasiones los insectos pican al sentirse amenazados, evite:

- La proximidad de sus nidos, colmenas.
- Realizar aspavientos si alguno se le acerca.
- Que sus familiares manipulen los nidos.

Su agresividad aumenta con el calor y al defender comida o bebida dulce (especialmente refrescos), con los perfumes y olores fuertes, evite:

- Comer al aire libre
- Manipular contenedores de basuras.
- Realizar actividades de jardinería.
- Ir descalzo/a o con sandalias.
- Colonias, perfumes, ambientadores, etc.
- Ropas holgadas y de colores vivos.
- Depositar la ropa al aire libre (en todo caso, deberías sacudirla antes de utilizarla).

Antes de iniciar la conducción de un vehículo asegúrese de que no hay insectos en el mismo, conduzca con las ventanillas cerradas.

En caso de una picadura, incluso sin ser alérgico, se recomienda no permanecer en la zona, ya que las feromonas de alarma liberadas durante el ataque podrían inducir nuevas picaduras.

En caso de picadura acuda rápido al médico o servicio de URGENCIAS más cercano.

Tras realizar el diagnóstico adecuado el ALERGOLOGO valorará la necesidad de tratamiento:

- **INMEDIATO:** generalmente con ADRENALINA autoinyectable en caso de reacciones graves. Diferir el uso de adrenalina utilizando otros fármacos (corticoides, antihistamínicos) puede provocar la muerte del paciente. La adrenalina puede no ser suficientemente efectiva en reacciones muy graves, incluso el paciente puede olvidar llevarla encima, por tanto este fármaco no puede garantizar una seguridad absoluta en caso de nuevas picaduras.
- **PREVENTIVO:** mediante INMUNOTERAPIA específica, único tratamiento capaz de bloquear los síntomas en caso de nuevas picaduras (de hecho las dosis máximas suelen ser equivalentes a una o dos picaduras).

